

Arzneimittel	Absetzen vor Test
<b>Antihistaminika</b>	
H <sub>1</sub> -Blocker (Dimetinden, Clemastin, Cetirizin, Loratadin, Desloratadin, Fexofenadin)	> 3 Tage
H <sub>2</sub> -Blocker (Ranitidin, Cimetidin)	∅
<b>Mastzellstabilisatoren</b>	
Cromoglicinsäure, Nedocromil	∅
Ketotifen	> 5 Tage
<b>Glukokortikoide</b>	
Topisch > 4 Wochen	> 1 Woche
Inhalativ	∅
Systemisch/Kurzzeit:	
< 50mg/d Prednisolonäquivalent	> 3 Tage
> 50mg/d Prednisolonäquivalent	> 1 Woche
Systemisch/Langzeit	
< 10mg/d Prednisolonäquivalent	∅
> 10mg/d Prednisolonäquivalent	> 3 Wochen
<b>Broncholytika</b>	
Salmeterol	∅
Salbutamol	∅
Theophyllin	∅
<b>Psychopharmaka</b>	
Trizyklische Antidepressiva (Imipramin, Amitriptylin, Desipramin, ..)	> 2 Wochen
Neuroleptikum (Promethazin)	> 5 Tage
Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (Fluoxetin, Sertralin)	∅
β-adrenerge Agonisten	∅
<b>Sonstige systemisch angewandte Arzneistoffe</b>	
Leukotrien-Rezeptorantagonisten	∅
Ciclosporin A	∅
Intravenöse Immunglobuline	∅